

Aus der Med. Poliklinik der Universität München
Direktor: Prof. Dr. N. Zöllner

VERÄNDERUNGEN DER PHOSPHATIDFRAKTIONEN IN DEN
LIPOPROTEINFRAKTIONEN DES PLASMAS DURCH DIE
FETTZUFUHR

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde in der gesamten Medizin
an der Ludwig Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von
Oswald Spitzenberger
aus
Mitterfirmiansreut
Jahr
1981

Mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität München

Berichterstatter: Prof. Dr. G. Wolfram
Mitberichterstatter: Prof. Dr. N. Zöllner
Dekan: Prof. Dr. W. Spann
Tag der mündlichen Prüfung: 17.12.1981



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530
531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580
581 582 583 584 585 586 587 588 589 590
591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610
611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
671 672 673 674 675 676 677 678 679 680
681 682 683 684 685 686 687 688 689 690
691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760
761 762 763 764 765 766 767 768 769 770
771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
781 782 783 784 785 786 787 788 789 790
791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810
811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
821 822 823 824 825 826 827 828 829 830
831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860
861 862 863 864 865 866 867 868 869 870
871 872 873 874 875 876 877 878 879 880
881 882 883 884 885 886 887 888 889 890
891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910
911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
921 922 923 924 925 926 927 928 929 930
931 932 933 934 935 936 937 938 939 940
941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960
961 962 963 964 965 966 967 968 969 970
971 972 973 974 975 976 977 978 979 980
981 982 983 984 985 986 987 988 989 990
991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Gewidmet meiner Frau Eva

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040
1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050
1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060
1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070
1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080
1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090
1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130
1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140
1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150
1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160
1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170
1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180
1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190
1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200
1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210
1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220
1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230
1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240
1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250
1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260
1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270
1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280
1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290
1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300
1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310
1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320
1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330
1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340
1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350
1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360
1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370
1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400
1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410
1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430
1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440
1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450
1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460
1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470
1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480
1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490
1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500
1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510
1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520
1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530
1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540
1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550
1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560
1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570
1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580
1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590
1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600
1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610
1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620
1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630
1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640
1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650
1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660
1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670
1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680
1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690
1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700
1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710
1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720
1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730
1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740
1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750
1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760
1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770
1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780
1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790
1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800
1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810
1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820
1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830
1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840
1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860
1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

A b s t r a c t

SPITZENBERGER, OSWALD:

VERÄNDERUNGEN DER PHOSPHATIDFRAKTIONEN IN DEN LIPOPROTEINFRAKTIONEN DES PLASMAS DURCH DIE FETTZUFUHR

Sechs gesunde, weibliche Versuchspersonen erhielten jeweils 2 Wochen lang drei verschiedene Formeldiäten, wobei die Zuteilung zu den Formeldiäten in Zweiergruppen unterschiedlich war. Formeldiät I war fettfrei, der Eiweißgehalt war mit 15 % der Nahrungsenergie bei allen Formeldiäten gleich. Formeldiät II und III hatten einen Fettanteil von 30 %. Der P/S Quotient war bei Formeldiät II 0,47 und bei Formeldiät III 11,14. Die relativen und absoluten Konzentrationen von Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin wurden in den Lipoproteinfraktionen VLDL, LDL und HDL mittels tubulärer Dünnschichtchromatographie bestimmt. Der prozentuale Anteil des Lecithin an den gesamten Phosphatiden nahm in der LDL- und HDL-Fraktion mit steigendem P/S Quotienten ab. Auch die absoluten Lecithinmengen nahmen beim Übergang von herkömmlicher Kost auf die fettfreie Formeldiät deutlich ab. Die Formeldiät II mit einem Fettanteil von 30 % ließ die Lecithinkonzentrationen wieder etwas ansteigen. Die niedrigsten Werte wurden in der LDL- und HDL-Fraktion unter Formeldiät III gemessen. Die Lecithinwerte in der VLDL-Fraktion blieben unter Formeldiät I unverändert und sanken unter Formeldiät II auf weniger als die Hälfte des Ausgangswertes ab. Unter Formeldiät III nahm das Lecithin in der VLDL-Fraktion wieder gering zu. Die relativen Sphingomyelin- und Lysolecithinwerte änderten sich dem Lecithin entgegengesetzt, während die absoluten Konzentrationen ein ähnliches Verhalten wie die Lecithinfraktion zeigten.

1.	<u>EINLEITUNG</u>	1
2.	<u>METHODIK</u>	3
2.1	Die tubuläre Dünnschichtchromatographie	3
2.2	Der Arbeitsablauf	3
2.2.1	Reinigen und Prüfen der Quarzröhrchen	3
2.2.2	Auftragen	4
2.2.3	Fließmittel und Trocknen	4
2.2.4	Scannen	5
2.2.5	Charakterisierung der Peaks	5
2.2.6	Quantifizierung der Peaks	6
2.3	Prinzip des Becker - TLC - Detector	6
2.4	Eichkurven	7
2.4.1	R_f - Wert	7
2.4.2	Flächenwerte	8
2.5	Die Lipoproteinfraktionen	9
2.6	Lipoidextrakt nach Sperry	9
2.6.1	Extraktion	9
2.6.2	Reinigung	9
2.6.3	Einengen	10
2.7	Formeldiät	10
2.7.1	Zusammensetzung der Formeldiäten	10
3.	<u>ERGEBNISSE</u>	12
3.1	VLDL	12
3.1.1	Prozentuale Änderung der Einzelwerte	12
3.1.2	Absolute Änderung der Einzelwerte	12
3.2	LDL	13
3.2.1	Prozentuale Änderung der Einzelwerte	13
3.2.2	Absolute Änderung der Einzelwerte	14
3.3	HDL	14
3.3.1	Prozentuale Änderung der Einzelwerte	14
3.3.2	Absolute Änderung der Einzelwerte	15

4.	<u>DISKUSSION</u>	17
4.1	Vergleich der einzelnen Ausgangswerte von Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin mit Ergebnissen anderer Untersuchungen	17
4.1.1	VLDL	17
4.1.2	LDL	18
4.1.3	HDL	18
4.2	Vergleich der mittleren Ausgangswerte von Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin mit Ergebnissen anderer Untersuchungen	19
4.2.1	VLDL	19
4.2.2	LDL	20
4.2.3	HDL	20
4.3	Relative und absolute Änderung der Mittelwerte von Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin unter drei verschiedenen Formeldiäten im Vergleich mit Ergebnissen anderer Untersuchungen	21
4.3.1	VLDL	21
4.3.2	LDL	22
4.3.3	HDL	23
5.	<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>	24
6.	<u>LITERATURVERZEICHNIS</u>	25
7.	<u>ANHANG</u>	33

1. EINLEITUNG

Phosphatide spielen eine wichtige Rolle als Bausteine biologischer Membranen. Chemisch handelt es sich hierbei um Phosphodiester. Die Phosphorsäure ist an einer Hydroxylgruppe mit dem dreiwertigen Alkohol Glycerin oder dem Amino-di-alkohol Sphingosin verestert. Die andere Esterbindung hält Substituenten wie Cholin, Äthanolamin, Serin oder Inosit (20). 1,2-dilinoleoylphosphatidylcholin ist der Prototyp eines mehrfach ungesättigten Phosphatidylcholinmoleküls (9, Abb. 1). Die mengenmäßig größte Phospholipidfraktion ist das Lecithin; es folgen Sphingomyelin und Lysolecithin. Die Phosphatide kommen im Serum als Bestandteile der einzelnen Lipoproteinfraktionen vor. Ihr Anteil ist am höchsten in den high-density Lipoproteinen, nimmt in den low-density Lipoproteinen und besonders in den very-low-density Lipoproteinen ab und ist in den Chylomikronen praktisch zu vernachlässigen. Ein hoher LDL-Cholesteringehalt im Serum gilt als wichtiger Risikoindikator für das Auftreten der Arteriosklerose und der koronaren Herzkrankheit (4, 7, 8, 10, 36). Heute überwiegt die Meinung, daß hohe LDL-Cholesterinwerte ein geringeres Risiko darstellen als zu niedere HDL-Cholesterinwerte (15). Negative Auswirkungen auf den HDL-Cholesterinspiegel sind beschrieben bei Fettsucht (40), Zigarettenkonsum (13), Einnahme von Kontrazeptiva (2) und bei Diabetes mellitus (15, 31). Positive Beziehungen bestehen zwischen HDL-Cholesterinwerten einerseits, sowie körperlichem Training (43), der Wirkung von Östrogenen (17) und mäßigem Alkoholkonsum (19). Formeldiäten mit hohem Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren verändern die einzelnen Lipoproteinfraktionen (14, 33). Als deren Bestandteil sind die Phosphatide und in erster Linie das Lecithin betroffen (1, 41).

Wir haben den Einfluß von Formeldiäten mit verschiedenen Fettarten auf die Phosphatidfraktionen der einzelnen Lipoproteinfraktionen untersucht.

2. METHODIK

2.1 Die tubuläre Dünnschichtchromatographie

Die tubuläre Dünnschichtchromatographie ist ein modifiziertes Verfahren der Dünnschichtchromatographie. Die Grundlage bildet die von Wagner (38) und Wagner et al (39) entwickelte Methode zur Trennung von Lipoiden mit Kieselgel als Sorptionsmittel. Skipski et al (34) verbesserten das Verfahren im Hinblick auf die Trennschärfe und erhielten genauere Meßergebnisse für die nur in geringeren Mengen vorhandenen Phosphatide. Die tubuläre Dünnschichtchromatographie in der jetzigen Form basiert auf den Forschungen von Mukherjee et al (23). Die Innenwand eines Quarzröhrchens wird mit Kieselgel als Sorptionsmittel beschichtet. Ein geeignetes Lösungsmittelsystem z.B. Chloroform, Methanol, Wasser im Verhältnis 65:25:4 trennt die einzelnen Substanzen. Die Röhrchen werden in einem Scanner -Becker TLC-Detector- segmental erhitzt, wobei die entsprechenden Zonen organischer Verbindungen zu CO_2 oxidiert werden. Das Kohlendioxid wird zu Methan reduziert und quantitativ bestimmt. Als Transportmittel dient Stickstoff.

2.2 Der Arbeitsablauf

2.2.1 Reinigen und Prüfen der Quarzröhrchen

Es werden Quarzröhrchen mit 200 mm Länge und 6 mm Durchmesser verwendet. Sie sind innen mit einer Mischung aus Kieselgel und 10 % Kupferoxid beschichtet. Zur Reaktivierung des CuO werden die Röhrchen in der Flamme eines Bunsenbrenners rotglühend erhitzt, während Luft durchgeblasen wird. Dabei werden eventuell vorhandene organische Substanzen oxidiert und mit dem Luftstrom entfernt.

Die Röhrchen werden an einem Ende in Aceton getaucht, das als unpolares Lösungsmittel Lipide und lipidähnliche Substanzen an den oberen Rand der Kieselgelschicht transportiert. Nach etwa zehnminütiger Trocknung erfolgt eine erneute Erhitzung auf dem Bunsenbrenner. Um Verunreinigungen zu vermeiden wird das Röhrchen dann nur mehr an einem Ende berührt. Durch einen oder mehrere Probeläufe im TLC-Detector prüft man auf noch vorhandene organische Verunreinigungen. Für den weiteren Versuchsablauf werden Röhrchen verwendet, die bei geringer Abschwächung des FID-Signals, Schalterstellung: Range 1/ Attenuator 4, auf dem Kompensationsschreiber Ausschläge von höchstens 5 cm haben.

2.2.2 Auftragen

Eine Mikroliterspritze wird durch mehrmaliges Aufziehen mit Chloroform gereinigt. Es werden 5 Mikroliter eines Lipoidextraktes nach Folch-Sperry (45) aufgezogen. Die Nadel der Mikroliterspritze wird etwa 2 cm in ein vorher geprüftes Quarzröhrchen eingeführt, wobei die Kieselgelschicht nicht zerkratzt werden darf. Am oberen Ende des Röhrchens befestigt man einen Schlauch, durch den Stickstoff strömt. Durch leichtes Antippen der Mikroliterspritze wird ein punktförmiger Substanzfleck erzeugt, der schnell von der Kieselgelschicht aufgesogen wird. Diesen Vorgang wiederholt man, bis die gesamte Substanz aufgetragen ist.

2.2.3 Fließmittel und Trocknen

Die Quarzröhrchen werden nach zweistündigem Trocknen in ein Fließmittel aus Chloroform: Methanol: Aqua bidest: 65: 35: 4: v: v: v: gestellt. Das Fließmittel soll etwa 5 mm der Kieselgelschicht bedecken.

Die punktförmige Auftragstelle muß auf jeden Fall frei sein. Die einzelnen Lipide und lipidähnlichen Stoffe wandern verschieden weit und werden getrennt. Wenn das Fließmittel den oberen Rand der Kieselgelschicht erreicht hat, ist der Trennvorgang beendet. Die Quarzröhrchen werden in einem zylindrischen Ofen unter Stickstoffzufuhr bei 80° C mindestens 4 h getrocknet.

2.2.4 Scannen

Nach dem Trocknen werden die Röhrchen im TLC-Detector versenkt und erhitzt, wobei die leicht flüchtigen organischen Substanzen eliminiert werden. Dieser Vorgang wird beendet, wenn sich bei geringer Abschwächung des FID-Signals, Schalterstellung Range 1/ Attenuator 4, auf dem Elektrometer der Schreiber im linken Skalendrittel zwischen Teilstrich 20 und 30 befindet. Die Quarzröhrchen werden nun mit einer Geschwindigkeit von 1 cm/min. gescannt. Das FID-Signal muß auf dem Elektrometer soweit abgeschwächt werden, daß die Ausschläge vollständig abgebildet werden. Bei zu großer Abschwächung sind die Ausschläge nicht mehr deutlich zu identifizieren und die Genauigkeit ist vermindert. Als am besten geeignet haben sich folgende Schalterstellungen auf dem Elektrometer erwiesen: R 1/ A 64, R 10/ A 32, R 10/ A 16.

2.2.5 Charakterisierung der Peaks

Um die einzelnen Peaks richtig deuten zu können, mißt man in einer Reihe von Vorversuchen die Entfernung zwischen der Lösungsmittelfront und den Peaks der Reinsubstanzen. Mit Hilfe dieser R_f - Werte lassen sich die einzelnen Peaks identifizieren.

2.2.6 Quantifizierung der Peaks

Der Flächeninhalt eines bestimmten Peaks ist proportional zur aufgetragenen Menge einer Substanz. Je größer die Auftragsmenge einer Substanz ist, desto größer ist auch der Flächeninhalt eines Peaks. Um die prozentualen Anteile der einzelnen Fraktionen zueinander zu erhalten, setzt man die Gesamtfläche der Peaks 100 und errechnet aus den Flächenverhältnissen den prozentualen Anteil.

2.3 Prinzip des Becker-TLC-Detector (Abb. 2)

Das obere Ende des Quarzröhrchens ist mit der Stickstoffzufuhr verbunden (Weg A). Stickstoff ist als Trägergas geeignet, weil es keinen Beitrag zum FID-Signal liefert und die Ergebnisse nicht verfälscht. Das untere Ende des Röhrchens führt zum eigentlichen Oxydations-Reduktionssystem. Das Röhrchen kann über ein Federsystem ausgewechselt werden. Man schaltet bei diesem Vorgang auf By pass, d.h. der Weg A wird unterbrochen und auf Weg D abgelenkt. Ein Motor versenkt das Quarzröhrchen im Scanner, wobei die Geschwindigkeiten 0,5 cm/min., 1 cm/min. und 2 cm/min. möglich sind. Auf diese Weise werden segmentförmig alle Kohlenstoffverbindungen auf der Kieselgelschicht zu CO_2 und kurzkettigen organischen Verbindungen oxidiert. Im Kupferofen sind 650°C erforderlich, um diese Verbindungen zu 99,99 % in CO_2 umzuwandeln. Im nachgeschalteten Nickelofen wird das gebildete Kohlendioxyd bei 500°C mittels Wasserstoff (Weg C) zu Methan reduziert. Als Brenngase für den FID (= Flame ionisation detector) dienen Luft (Weg B) und Wasserstoff (Weg C). Die C-Atome, die in Form von Methan zum FID

gelangen, erzeugen ein Signal, das zum nachgeschalteten Elektrometer geleitet wird. Dort kann das Signal beliebig verstärkt oder abgeschwächt werden und erzeugt eine dem Kohlenstoffgehalt der Substanz proportionale Schreiberablenkung.

2.4 Eichkurven

2.4.1 R_f-Wert

Der R_f-Wert gibt die Entfernung zwischen dem Peak einer bestimmten Substanz und dem Peak der Lösungsmittelfront in cm an. Jede Substanz hat ihren charakteristischen R_f-Wert, der durch die Bestimmung von Standardlösungen der zu untersuchenden Substanzen ermittelt wird. Im folgenden sind Entfernung, Mittelwert und Standardabweichung bei Mehrfachmessung mit Standardsubstanzen angegeben.

Lecithin 11 Messungen, Entfernung (cm) zur Lösungsmittelfront: 11.7, 12.0, 12.0, 12.0, 13.1, 12.1, 12.0, 12.2, 12.0, 12.1, 12.2.

Mittelwert = 12.1 cm, Standardabweichung = 0.36.

Sphingomyelin 8 Messungen, Entfernung (cm) zur Lösungsmittelfront: 13.2, 14.2, 13.7, 13.4, 13.8, 13.2, 13.4, 13.7.

Mittelwert = 13.6 cm, Standardabweichung = 0.36.

Triglyceride 8 Messungen, Entfernung (cm) zur Lösungsmittelfront: 1.0, 1.2, 1.2, 1.3, 1.3, 1.0, 1.0, 1.2.

Mittelwert = 1.15, Standardabweichung = 0.13.

Die Identifizierung der einzelnen Substanzen bereitet wegen der geringen Abweichung keine Schwierigkeit. Das Phospholipidmuster in den einzelnen Lipoproteinfraktionen ist eindeutig.

2.4.2 Flächenwerte

Zur Bestimmung des Verhältnisses zwischen eingesetzter Substanzmenge und entsprechendem Flächeninhalt des Peaks verwendet man die Reinsubstanz. Man stellt aus der Substanz eine Verdünnungsreihe her und vergleicht damit die verschiedenen Flächeninhalte der Peaks. Interessiert nur das relative Verhältnis der einzelnen Phospholipidkomponenten zueinander, kann an Stelle der Reinsubstanz auch ein Substanzgemisch verwendet werden. Substanzverluste während des Arbeitsablaufes führen zu keiner Verfälschung der Ergebnisse, da sich die Anteile der Phosphatidfraktionen zueinander nicht ändern.

Standardbestimmung am Beispiel der HDL der Versuchsperson F vom 1.2.1978

Messung	Lecithin	Sphingomyelin	Lysolecithin
1	87.7	9.6	2.7
2	86.8	10.9	2.3
3	89.1	7.8	3.1
4	89.7	8.0	2.3
5	87.4	9.0	3.6
6	87.3	8.9	3.8
7	88.7	9.6	1.7
8	88.2	9.3	2.5
Mittelwert	88.1	9.1	2.8
S.E.	0.93	0.92	0.66

Die Genauigkeit der Bestimmung vermindert sich mit der aufgetragenen Substanzmenge. Die größte Phospholipidfraktion Lecithin hat die geringste S.E. von 1.05 % vom Mittelwert. Die Werte für Sphingomyelin liegen bei 10,1 % und die für Lysolecithin bei 23,5 %. Aus der Literatur bekannte Standardabweichungen sind am niedrigsten für

Lecithin und am höchsten für Lysolecithin (30, 32, 37).

2.5. Die Lipoproteinfraktionen

Die Isolierung der einzelnen Lipoproteinfraktionen des Serums erfolgt mittels Ultrazentrifugation bei verschiedenen Dichten mit der von Pedersen (26), Lindgren et al (21) und Havel et al (18) angegebenen Methode. Man erhält folgende drei Fraktionen:

1. Die very-low-density lipoproteins = VLDL mit einer Dichte kleiner 1.006
2. Die low-density lipoproteins = LDL mit einer Dichte zwischen 1.006 und 1.063
3. Die high-density lipoproteins = HDL mit einer Dichte größer 1.063.

2.6. Lipoidextrakt nach Sperry

2.6.1 Extraktion

1 ml Serum wird in einem 25 ml Meßkolben zu 8,3 ml Methanol getropft. Während des Zutropfens schüttelt man den Kolben vorsichtig, um eine möglichst feine Fällung der Proteine zu erreichen. Nach Zugabe von 9 ml Chloroform wird im Wasserbad zum Siedepunkt erhitzt. Nach dem Abkühlen füllt man mit Chloroform zur 25 ml Marke auf und mischt durch zehnmaliges Umkippen.

2.6.2 Reinigung

Den Extrakt filtriert man schnell, um Verdunstung zu vermeiden, durch ein weiches Faltenfilter (z.B. Schleicher-Schüll 2329 oder 604). Vom Filtrat pipettiert man sofort 20 ml in einen 25 ml Schüttelzylinder, gibt 8 ml 0,02 %ige CaCl_2 -Lösung dazu und schüttelt 1 min. kräftig. Die Phasentrennung

erfolgt binnen 24 Stunden. Das Volumen der Chloroformphase wird notiert, die obere Phase mit feiner Kapillare abgesaugt und verworfen.

2.6.3 Einengen

Die Chloroformphase wird auf dem Rotationsverdampfer bis zur Trockne eingengt und anschließend in 1 ml Chloroform aufgenommen. Man kann beliebig einengen bis etwa 0,1 ml um die günstigste Konzentration für den weiteren Arbeitsablauf zu erreichen. Eine Auftragsmenge von 5 Mikroliter ergab bei unseren Bestimmungen die besten Resultate. Die beim Formeldiätversuch je Bestimmung eingesetzte Chloroformphase betrug in der VLDL 15 ml, in der LDL 10 ml und in der HDL 25 ml.

2.7 Formeldiät

Sechs gesunde junge Frauen erhielten in Zweiergruppen drei verschiedene Formeldiäten über jeweils 2 Wochen. Die Zuteilung zu den Formeldiäten war für jede Zweiergruppe verschieden (Tab.1).

2.7.1 Zusammensetzung der Formeldiäten

Formeldiät I enthielt 15 Energieprozent Eiweiß und 85 Energieprozent Kohlenhydrate (Abb. 3). Formeldiät II und III enthielten 15 Energieprozent Eiweiß, 55 Energieprozent Kohlenhydrate und 30 Energieprozent Fett. Der Fettanteil war bei den Formeldiäten verschieden (Abb.3, Tab. 2). Das Fettgemisch der Formeldiät II enthielt 47,5 % einfach ungesättigte, 17 % mehrfach ungesättigte und 35,5 % gesättigte Fettsäuren (Tab. 3). Mit 2200 kcal der Formeldiät II wurden 10 g Linolsäure zugeführt. Das Verhältnis von mehrfach ungesättigten zu gesättigten Fettsäuren, der P/S Quotient, betrug 0,47.

Mit 2200 kcal der Formeldiät III wurden 50 g Linolsäure zugeführt, der P/S Quotient betrug 11,14. 2200 kcal jeder Formeldiät enthielten zusätzlich 500 g H₂O, 5 g NaCl, 3 g KCl und 0,6 g Cholesterin. Während der Versuchsdauer war kalorienfreie Flüssigkeit wie Tee oder Kaffee in beliebiger Menge erlaubt. Jeden Tag wurde ein Vitaminpräparat (Multibionta^R) verabreicht. Täglich wurden Gewichtskontrollen durchgeführt. Die Phosphatidfraktion wurde aus Blutentnahmen am 1.2.78 (Ausgangswert), am 15.2.78, am 1.3.78, am 15.3.78 (Versuchsende) und als Nachkontrolle am 10.5.78 jeweils nach 16-stündiger Nahrungskarenz um 9 h morgens bestimmt.

3. ERGEBNISSE

3.1 VLDL

3.1.1 Prozentuale Änderung der Einzelwerte (Abb. 4-15)

Die Ausgangswerte in Prozent unterschieden sich bei vier Personen nur geringfügig von den Ergebnissen der Nachkontrolle. Die Nachkontrollwerte der Versuchsperson A und D lagen für Lecithin deutlich niedriger, für Sphingomyelin und Lysolecithin waren sie entsprechend höher. Die relativen Lecithinwerte der Versuchspersonen A und B stiegen bei kohlenhydratreicher Formeldiät I an, fielen bei Formeldiät II (P/S-Quotient 0,47) auf die Ausgangswerte zurück und sanken unter Formeldiät III (P/S-Quotient 11,14) deutlich. Bei den Versuchspersonen C und D änderten sich die relativen Lecithinwerte unter Formeldiät I nicht. Unter Formeldiät II erhöhte sich der Lecithinanteil und sank unter Formeldiät III um denselben Prozentsatz wieder auf den Ausgangswert. Die relativen Lecithinwerte der Versuchspersonen E und F fielen unter kohlenhydratreicher Formeldiät I, waren unter Formeldiät II etwas höher und erreichten unter Formeldiät III wieder den Ausgangswert. Die relativen Sphingomyelinwerte änderten sich den Lecithinwerten entgegengesetzt. Die prozentualen Veränderungen blieben beim Lysolecithin unterhalb auswertbarer Grenzen.

3.1.2 Absolute Änderung der Einzelwerte (Abb. 16-27, Tab. 4,7)

Die Absolutwerte für Lecithin lagen bei allen sechs Versuchspersonen bei der Nachkontrolle niedriger als zu Versuchsbeginn. Die absoluten Sphingomyelin- und Lysolecithinmengen sanken ebenfalls deutlich. Die hohen Ausgangswerte für Lecithin bei den Ver-

suchspersonen A, D, E sanken unter der kohlenhydratreichen Formeldiät I und fielen unter Fettgemischdiät II noch deutlich ab. Unter Formeldiät III erfolgte bei den Versuchspersonen D und E ein geringer und bei Versuchsperson A ein deutlicher Anstieg der absoluten Lecithinmenge. Niedrige Lecithinausgangswerte bei den Versuchspersonen B, C und F zeigten unter Formeldiät I einen deutlichen Anstieg, der sich unter Formeldiät II nur bei Versuchsperson F leicht fortsetzte. Die Lecithinwerte der Versuchspersonen B und C fielen dagegen deutlich ab. Formeldiät III bewirkte geringe, aber uneinheitliche Veränderungen. Die absoluten Werte für Sphingomyelin und Lysolecithin veränderten sich wie die Lecithinwerte, jedoch mit deutlich geringerem Ausmaß.

3.2 LDL

3.2.1 Prozentuale Änderung der Einzelwerte (Abb. 28-39)

Die relativen Lecithinwerte waren bei der Nachkontrolle gegenüber dem Versuchsbeginn bei den Versuchspersonen A und D deutlich höher, bei Versuchsperson B unverändert und bei den Versuchspersonen C, E und F niedriger. Die relativen Sphingomyelinwerte verhielten sich dem Lecithin entgegengesetzt. Die Prozentwerte für Lysolecithin waren sowohl im zeitlichen Ablauf des Ernährungsexperimentes wie auch nach der einzelnen Formeldiät nur unwesentlich verändert. Die relativen Lecithinwerte der Versuchspersonen B, C, E und F sanken unter kohlenhydratreicher Formeldiät I, veränderten sich unter Formeldiät II geringfügig und fielen unter Formeldiät III ab. Bei Versuchsperson A mit sehr niedrigem Ausgangswert stieg der prozentuale Lecithinanteil unter

den Formeldiäten I, II und III jeweils gering an. Der ebenfalls sehr niedrige relative Lecithin-
ausgangswert der Versuchsperson D stieg unter
Formeldiät I deutlich, sank unter Fettgemischdiät
II leicht und erreichte unter Formeldiät III den
Ausgangswert. Die relativen Sphingomyelinwerte
änderten sich den Lecithinwerten entgegengesetzt.
Die prozentualen Veränderungen der Lysolecithin-
werte waren unbedeutend.

3.2.2 Absolute Änderung der Einzelwerte (Abb. 40-51, Tab. 5, 8)

Die Absolutwerte für Lecithin lagen bei fünf
Versuchspersonen bei der Nachkontrolle niedriger
als zu Versuchsbeginn. Die Lecithinwerte der
Versuchsperson A waren erhöht. Die Sphingomyelin-
mengen sanken ebenfalls deutlich bei fünf Versuchs-
personen und stiegen nur bei Versuchsperson C an.
Die absoluten Lysolecithinwerte waren nicht wesentlich
verändert. Die absoluten Lecithinwerte fielen bei
allen Versuchspersonen unter kohlenhydratreicher
Formeldiät I deutlich ab, stiegen unter Fettgemisch-
diät II wieder leicht an, um unter Formeldiät III
erneut stark abzusinken. Die in der LDL-Fraktion
sehr hohen Sphingomyelinwerte folgten im wesentlichen
den Veränderungen der Lecithinwerte. Nur bei den
Versuchspersonen E und F erhöhten sich unter Formel-
diät I die Absolutwerte für Sphingomyelin. Die sehr
geringen Lysolecithinmengen veränderten sich nur
unwesentlich.

3.3 HDL

3.3.1 Prozentuale Änderung der Einzelwerte (Abb. 52-63)

Die relativen Lecithinwerte waren bei der Nach-
kontrolle gegenüber dem Versuchsbeginn bei den
Versuchspersonen A, B, C und E deutlich höher, bei
Versuchsperson D unverändert und tiefer bei Ver-
suchsperson F mit ihren sehr hohen Ausgangswerten.

Die relativen Sphingomyelin- und Lysolecithinwerte verhielten sich dem Lecithin entgegengesetzt. Die relativen Lecithinwerte der Versuchspersonen A und B stiegen unter kohlenhydratreicher Formeldiät I an und sanken unter Formeldiät II und Formeldiät III wieder leicht ab. Bei den Versuchspersonen C und D erhöhte sich der relative Lecithinanteil unter Formeldiät I und II kontinuierlich und fiel unter Formeldiät III wieder ab. Die kohlenhydratreiche Formeldiät I führte bei Versuchsperson E zu einem Anstieg und bei Versuchsperson F zu einem Abfall der relativen Lecithinwerte. Unter Fettgemischdiät II sanken die prozentualen Lecithinmengen bei den Versuchspersonen E und F und stiegen unter Formeldiät III wieder leicht an. Die relativen Sphingomyelin- und Lysolecithinwerte verhielten sich dem Lecithin entgegengesetzt.

3.3.2 Absolute Änderung der Einzelwerte (Abb. 64-75, Tab. 6, 9)

Die Absolutwerte für Lecithin lagen bei den Versuchspersonen B, C, D und E bei der Nachkontrolle höher als zu Versuchsbeginn, dagegen die der Versuchspersonen A und F niedriger. Die Nachkontrollwerte für Sphingomyelin waren bei den Versuchspersonen A, B und C tiefer, bei Versuchsperson D höher und bei den Versuchspersonen E und F gleichbleibend. Die Absolutwerte für Lysolecithin waren unverändert oder niedriger. Die absoluten Lecithinwerte sanken bei den Versuchspersonen A, B, C, D und F unter kohlenhydratreicher Formeldiät I und stiegen unter Formeldiät II wieder an. Bei Versuchsperson E mit sehr niedrigem Ausgangswert, der wahrscheinlich zu niedrig bestimmt worden war, erhöhte sich der absolute Lecithinwert unter Formeldiät I und fiel unter Formeldiät II ab. Die absoluten Lecithinmengen

nahmen bei allen sechs Versuchspersonen unter Formeldiät III deutlich ab. Die absoluten Sphingomyelinwerte sanken bei allen Versuchspersonen unter kohlenhydratreicher Formeldiät I und stiegen unter Fettgemischdiät II wieder an. Dieser Anstieg setzte sich bei den Versuchspersonen C und D unter Formeldiät III fort; bei den Versuchspersonen A, B, E und F fielen die absoluten Sphingomyelinwerte wieder ab. Die absoluten Lysolecithinwerte sanken unter Formeldiät I ab. Unter Fettgemischdiät II waren die Lysolecithinmengen bei den Versuchspersonen A und B unverändert, bei den Versuchspersonen C und D niedriger und bei den Versuchspersonen E und F höher. Die absoluten Lecithinwerte stiegen bei den Versuchspersonen A und B unter Formeldiät III an, waren bei den Versuchspersonen C und D unverändert und fielen bei den Versuchspersonen E und F ab.

4. DISKUSSION

4.1 Vergleich der einzelnen Ausgangswerte von Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin mit Ergebnissen anderer Untersuchungen

4.1.1 VLDL (Tab. 10, 11)

In der VLDL-Fraktion sind 18 % Phosphatide enthalten (9). Die quantitative Bestimmung von Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin ist wegen der geringen Substanzmengen schwierig (18). Das Vorhandensein von Lysolecithin wurde überhaupt erst durch die Forschungsarbeit von Phillips (28) bewiesen. Bei allen Autoren (Tab. 10, 11) läßt sich eine große Streubreite der Werte feststellen, die die relativen, besonders aber die absoluten Werte betrifft. Diese Tatsache spricht entweder für einen raschen Stoffwechsel oder für methodische Schwierigkeiten in der VLDL-Fraktion. Stoffwechselbeziehungen zu Chylomikronen und der LDL-Fraktion sind aus der Literatur bekannt (16). Beim Vergleich der relativen Phosphatidwerte muß man berücksichtigen, daß in dieser Arbeit die Werte für Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin zusammen als 100 % gerechnet wurden. Die anderen Autoren berücksichtigten auch die kleineren Phosphatidfraktionen wie Phosphatidylinositol, Phosphatidylserin, Phosphatidyläthanolamin. Dadurch ergaben sich für die drei großen Phosphatidkomponenten entsprechend verminderte Prozentwerte. Die exzessiv hohen Absolutwerte in den Untersuchungen von Nelson und Freeman (24) lassen sich durch die kurze Zeitspanne von 3 Stunden zwischen Nahrungszufuhr und Blutentnahme

kaum in der VLDL-Fraktion, sicher aber nicht in der LDL-Fraktion erklären. Bei allen anderen Versuchen war eine mindestens 12-stündige Fastenperiode vorausgegangen. Untersuchungen an Frauen (35), wie sie auch in unserem Formeldiätexperiment durchgeführt wurden, ergaben keine Unterschiede im Vergleich zu Studien an gemischten Versuchsgruppen (24, 30).

4.1.2 LDL (Tab. 12, 13)

In der LDL-Fraktion sind 23 % Phosphatide enthalten (9). Die absoluten Mengen von Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin liegen um das 3-4-fache höher als in der VLDL-Fraktion (18). Die quantitative Bestimmung ist einfacher und genauer. Die Streubreite ist bei den Absolutwerten deutlich geringer. Beim Vergleich der relativen Phosphatidwerte mit der gegenwärtigen Studie muß man wie bei der VLDL-Fraktion berücksichtigen, daß die Prozentwerte der anderen Autoren um ca. 5 % niedriger liegen. Die Phosphatidwerte in der Studie von Choksey und Fosbrooke (7) zeigten keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den anderen Arbeiten (24, 35), obwohl die Untersuchungen an Kindern vorgenommen worden waren.

4.1.3 HDL (Tab. 14, 15)

Die HDL-Fraktion beinhaltet mit 30 % den größten Phosphatidanteil von allen Lipoproteinfraktionen (9). Die absoluten Mengen von Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin liegen um das 1,5-2-fache höher als in der LDL-Fraktion und um das 5-7-fache höher als in der VLDL-Fraktion (18). Die Streubreite der Absolutwerte ist ungefähr dieselbe wie

in der LDL-Fraktion. Die gegenwärtige Studie bezeichnet als HDL nicht nur die Lipoproteinfraktion der Dichteklasse 1.063 - 1.21, sondern alle Lipoproteine mit spezifischer Dichte größer als 1.063. Die Lipoproteine mit einer spezifischen Dichte über 1.21 werden von anderen Autoren (30, 33) auch als pre-alpha oder very-high-density Lipoproteine bezeichnet, sind quantitativ unbedeutend, besitzen aber einen besonders hohen Anteil an Lysolecithin (30). Auch andere Autoren (29, 30, 35) bezeichnen als HDL-Fraktion die Dichteklasse D größer 1.063. Nur die Ergebnisse von Choksey und Fosbrooke (7) beziehen sich auf den Bereich der Dichteklasse 1.063 - 1,21. Erhöht man die Prozentwerte der anderen Autoren (7, 29, 30, 35) um ca. 5 %, entsprechend dem Anteil der nicht berücksichtigten kleinen Phospholipidfraktionen, so stimmen sie mit den Ergebnissen des Formeldiätversuchs gut überein.

4.2 Vergleich der mittleren Ausgangswerte von Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin mit Ergebnissen anderer Untersuchungen

4.2.1 VLDL (Tab. 16, 17)

Die relativen Mittelwerte für Lecithin ergeben große Unterschiede zwischen den einzelnen Autoren. Bei den Sphingomyelin- und Lysolecithinwerten sind die Abweichungen nur geringfügig. Robinson und Phillips (32) stellten fest, daß die dünnschichtchromatographische Trennung der Phosphatide für Sphingomyelin die besten Resultate ergibt. Die Ursache dafür ist die deutliche Abgrenzung des Sphingomyelin auf der Dünnschicht. Um vergleichbar zu sein, müssen die relativen Mittelwerte der

Autoren (24, 30, 35), wie bereits begründet, um ca. 5 % erhöht werden. Als die Ursache für die hohen Absolutwerte der Untersuchung von Nelson und Freeman (24) könnte, wie bei den Einzelwerten in der VLDL-Fraktion festgestellt, die postprandiale Blutabnahme diskutiert werden. Die absoluten Sphingomyelin- und Lysolecithinmengen zeigen zur gegenwertigen Studie nur geringfügige, die Lecithinmengen größere Abweichungen.

4.2.2 LDL (Tab. 18, 19)

Die relativen Mittelwerte sind bei den Autoren (7, 24, 35) ebenfalls um etwa 5 % zu erhöhen und unterscheiden sich nur geringfügig untereinander und von der gegenwärtigen Studie. Gegenüber der VLDL-Fraktion sind die Mittelwerte für Lecithin und Lysolecithin prozentual erniedrigt, für Sphingomyelin deutlich erhöht (7, 35). Die absoluten Mittelwerte zeigen für Lecithin und Lysolecithin nur geringe Abweichungen und liegen bei Sphingomyelin innerhalb einer Schwankungsbreite von weniger als 2 mg / 100 ml. Die hohen Relativwerte für Sphingomyelin drücken sich in den Absolutwerten noch deutlicher aus, während die Lysolecithinmengen gering sind.

4.2.3 HDL (Tab. 20, 21)

Die relativen Mittelwerte für Lecithin und Sphingomyelin zeigen nur geringe Abweichung, wenn man die unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen berücksichtigt. Die hohen Lysolecithinwerte in dieser Lipidfraktion zeigen bei den einzelnen Untersuchern größere Unterschiede (27, 29, 35). Die absoluten Lecithinmengen sind etwa doppelt so groß

wie in der LDL-Fraktion und zeigen eine stärkere Streuung. Die absoluten Mittelwerte für Sphingomyelin sind denen in der LDL-Fraktion vergleichbar, weichen aber etwas stärker voneinander ab. Gillet und Besterman (12) fanden bei den Frauen geringere Lysolecithinwerte als bei den Männern. Die Untersuchung von Skipski (35) und unsere Ergebnisse, bei denen nur Frauen untersucht wurden, unterstützen diese Aussage. Die absoluten Mittelwerte für Lysolecithin sind in diesen Untersuchungen niedriger als bei den anderen Autoren (7, 29).

4.3 Relative und absolute Änderung der Mittelwerte von Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin unter drei verschiedenen Formeldiäten im Vergleich mit Ergebnissen anderer Untersuchungen

4.3.1 VLDL (Abb. 76 - 79)

Der prozentuale Anteil der Lecithinfraktion liegt bei der Nachkontrolle im Mittel unter den Ausgangswerten, die relativen Sphingomyelinwerte sind gering höher, während sich der prozentuale Anteil des Lysolecithin verdoppelt. Unter der kohlenhydratreichen Formeldiät I steigt der relative Lecithinanteil in der VLDL-Fraktion und erreicht unter Fettgemischdiät II den höchsten Prozentsatz. Formeldiät III senkt den relativen Lecithinanteil. Gijone et al (11) erzielten ähnliche Resultate bei Diätversuchen mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die Sphingomyelin- und Lysolecithinanteile verändern sich dem Lecithin entgegengesetzt.

Die mittleren absoluten Nachkontrollwerte für Lecithin und Sphingomyelin liegen deutlich unter den Ausgangswerten. Die mittlere Konzentration

von Lysolecithin ist im Vergleich zum Nachkontrollwert verdoppelt. Formeldiät I ändert die absoluten Lecithin- und Sphingomyelinmengen in der VLDL-Fraktion nicht, senkt aber den Lysolecithingehalt. Unter Formeldiät II fallen die Absolutwerte bei allen Phospholipidfraktionen deutlich ab, z.B. bei Lecithin von 12 mg auf 4 mg. Formeldiät III erhöht die Werte leicht. Sie liegen aber deutlich unter den Ausgangswerten. Gordon et al (14) führten Versuche mit hohen P/S Quotienten in der Nahrung durch und erhielten vergleichbare Ergebnisse.

4.3.2 LDL (Abb. 80 - 83)

Die mittleren relativen Nachkontrollwerte sind bei allen drei Phosphatidfraktionen gegenüber den Ausgangswerten unverändert. Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin verhalten sich im zeitlichen Ablauf wie in den Versuchen von Wolfram (41) und Wolfram und Wegehaupt (42). Dort war unter fettarmer, glucosereicher Diät der relative Lecithinanteil gesunken und nach etwa zwei Wochen wieder langsam bis zum Ausgangswert gestiegen. Sphingomyelin und Lysolecithin hatten sich entgegengesetzt verhalten. Unter fettarmer, kohlenhydratreicher Formeldiät I fallen Lecithin und Lysolecithin relativ ab, Sphingomyelin steigt prozentual an (44). Fettgemischdiät II senkt den Lecithinanteil weiter und erhöht die Prozentwerte für Sphingomyelin und Lysolecithin. Formeldiät III verändert die relativen Phosphatidwerte nicht wesentlich.

Die mittleren absoluten Nachkontrollwerte liegen bei Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin deutlich unter den Ausgangswerten. Unter der kohlenhydrat-

reichen Formeldiät I fallen die Absolutwerte der drei Phosphatidkomponenten in der LDL-Fraktion deutlich ab. Darin ergibt sich Übereinstimmung mit den Forschungsarbeiten von Zöllner et al (44), Wolfram (41) und Wolfram und Wegehaupt (42). Fettgemischdiät II erhöht die Absolutmengen von Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin. Unter Formeldiät III mit dem hohen P/S Quotienten von 11,14 fallen alle Absolutwerte deutlich ab (1, 11, 22).

4.3.3 HDL (Abb. 84 - 87)

Die mittleren relativen Nachkontrollwerte für Lecithin liegen über den Ausgangswerten, für Sphingomyelin und Lysolecithin aber sind sie niedriger. Unter Formeldiät I steigt der relative Lecithinanteil in der HDL-Fraktion. Die Prozentzahlen für Sphingomyelin und Lysolecithin sinken. Fettgemischdiät II senkt den prozentualen Lecithin- und Lysolecithinanteil; Sphingomyelin nimmt relativ zu. Unter Formeldiät III fallen die Prozentzahlen für Lecithin weiter ab, für Sphingomyelin und Lysolecithin steigen sie an.

Die mittleren absoluten Nachkontrollwerte für Sphingomyelin und Lysolecithin liegen unter den Ausgangswerten, für Lecithin sind sie leicht erhöht. Unter der kohlenhydratreichen Formeldiät I fallen die Absolutwerte der drei Phosphatidkomponenten in der HDL-Fraktion deutlich ab (41, 42, 44). Fettgemischdiät II erhöht die Absolutmengen von Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin. Unter Formeldiät III fallen alle Absolutwerte deutlich ab (1, 11, 14, 22). Über ein Ansteigen der HDL-Phosphatide unter Diäten mit hohem P/S Quotienten berichtet Shepherd (33).

5. ZUSAMMENFASSUNG

Sechs gesunde, weibliche Versuchspersonen erhielten jeweils 2 Wochen lang drei verschiedene Formeldiäten, wobei die Zuteilung zu den Formeldiäten in Zweiergruppen unterschiedlich war. Formeldiät I war fettfrei, der Eiweißgehalt war mit 15 % der Nahrungsenergie bei allen Formeldiäten gleich. Formeldiät II und III hatten einen Fettanteil von 30 %. Der P/S Quotient war bei Formeldiät II 0,47 und bei Formeldiät III 11,14. Die relativen und absoluten Konzentrationen von Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin wurden in den Lipoproteinfraktionen VLDL, LDL und HDL mittels tubulärer Dünnschichtchromatographie bestimmt. Der prozentuale Anteil des Lecithin an den gesamten Phosphatiden nahm in der LDL- und HDL-Fraktion mit steigendem P/S Quotienten ab. Auch die absoluten Lecithinmengen nahmen beim Übergang von herkömmlicher Kost auf die fettfreie Formeldiät deutlich ab. Die Formeldiät II mit einem Fettanteil von 30 % ließ die Lecithinkonzentrationen wieder etwas ansteigen. Die niedrigsten Werte wurden in der LDL- und HDL-Fraktion unter Formeldiät III gemessen. Die Lecithinwerte in der VLDL-Fraktion blieben unter Formeldiät I unverändert und sanken unter Formeldiät II auf weniger als die Hälfte des Ausgangswertes ab. Unter Formeldiät III nahm das Lecithin in der VLDL-Fraktion wieder gering zu. Die relativen Sphingomyelin- und Lysolecithinwerte änderten sich dem Lecithin entgegengesetzt, während die absoluten Konzentrationen ein ähnliches Verhalten wie die Lecithinfraktion zeigten.

6.

LITERATURVERZEICHNIS

- 1) Adam, O., Wolfram, G. und Zöllner, N.:
Quantitative Bestimmung der Phospholipid-
fraktionen im Serum mittels tubulärer Dünnschichtchromatographie. Der Einfluß verschiedener Formeldiäten auf die Phosphatidfraktion im Serum. Fette Seifen Anstrichmittel 11: 436, 1978
- 2) Arntzenius, A.O., van Gent, C.M., van der Voort, H., Stegerhoek, C.I. and Styblo, K.:
Reduced high density lipoprotein in women aged 40-41 during oral contraceptives. Consultation Bureau Heart Project. Lancet 1: 1221-1223, 1978
- 3) Blum, C.B., Levy, R.I., Eisenberg, S., Hall, M.III, Goebel, R.H. and Berman, M.:
High density lipoprotein metabolism in man. J.clin.invest. 60: 795-807, 1977
- 4) Böttcher, O.J.F. and Woodford, F.P.: Lipid and fatty-acid composition of plasma lipoproteins in cases of aortic atherosclerosis. J. atheroscler. res. 1: 434-443, 1961
- 5) Castelli, W.P., Gordon, T., Hjortland, M.C., Kagan, A., Doyle, J.T., Hames, C.G., Hulley, S.B. and Zukel, W.J.: Alcohol and blood lipids. The cooperative lipoprotein phenotyping study. Lancet 2: 153-155, 1977
- 6) Chin, H.P.: The sphingomyelin content of human serum. A genetic study. Biochim. Biophys. Acta 152: 346-352, 1968

- 7) Choksey, S. and Fosbrooke A.: Serum phospho-
lipids in children with familial hyper-
cholesterolaemia. *Clin. Chim. Acta* 47: 93-
96, 1973
- 8) Cornwell, D.G., Kruger, F.A., Hamwi, G.J.
and Brown, J.B.: Studies on the characterization
of human serum lipoproteins separated by ultra-
zentrifugation in a density gradient. I. Serum
lipoproteins in normal, hyperthyroid and
hypercholesterolemic subjects. *Amer. J.nutr.*
9: 24-40, 1961
- 9) Fox, J.M.: A glossary of essential phospholipids,
lipids and lipoproteins. In: *Phosphatidylcholine*,
p. 3-7, H. Peeters, ed. Springer Verlag Berlin,
Heidelberg, New York, 1976
- 10) Fredrickson, D.S., Levy, R.I. and Lees, R.S.:
Fat transport in lipoproteins - an integrated
approach to mechanisms and disorders. *New Engl.*
J.Med. 276: 34-44, 94-103, 148-156, 215-225,
273-281, 1967
- 11) Gijone, E., Nordoy, A., Blomhoff, J.P. and
Wiencke, I.: The effects of unsaturated and
saturated dietary fats on plasma cholesterol,
phospholipids and lecithin: cholesterol
acyltransferase activity. *Acta med. Scand.*
191: 481-484, 1972
- 12) Gillett, M.P.T. and Besterman, E.M.M.: Plasma
concentrations of lysolecithin and other phospho-
lipids in the healthy population and in men
suffering from atherosclerotic diseases.

Atherosclerosis 22: 111-124, 1975

- 13) Goldbourt, U. and Medalie, J.H.: Characteristics of smokers, non-smokers and ex-smokers among 10 000 adult males in Israel. *Amer.J. Epidem.* 105: 75-86, 1977
- 14) Gordon, D.T. Pitas, R.E. and Jensen, R.G.: Effects of diet and type IIa hyperlipoproteinemia upon structure of triacylglycerols and phosphatidylcholines from human plasma lipoproteins. *Lipids* 10: 270-283, 1975
- 15) Gordon, T., Castelli, W.P., Hjortland, M.C., Kannel, W.B. and Dawber, T.R.: High density lipoprotein as a protective factor against coronary heart disease. The Framingham Study. *Amer. J. Med.* 62: 707-714, 1977
- 16) Gustafson, A.: Studies on human serum very low density lipoproteins. *Acta med. Scand. Suppl.* 446: 1-44, 1966
- 17) Gustafson, A. and Svanborg, A.: Gonadal steroid effects on plasma lipoproteins and individual phospholipids. *Endocrinology* 35: 203, 1972
- 18) Havel, R.J., Eder, H.A. and Bragdon, J.H.: The distribution and chemical composition of ultracentrifugally separated lipoproteins in human serum. *J. clin. invest.* 34: 1345 - 1353, 1955
- 19) Johansson, B.G. and Laurell, C.B.: Disorders

of the serum alpha-lipoproteins after alcoholic intoxication. Scand. J. clin. lab. invest. 23: 231-233, 1969

- 20) Karlson, P.: Phospholipide, Glykolipide und Membranen. In: Kurzes Lehrbuch der Biochemie S. 211-222, P. Karlson, ed., Thieme Verlag Stuttgart 1974
- 21) Lindgren, F.T., Elliot, H.A. and Gofman, J.W.: The ultracentrifugal characterization and isolation of human blood lipids and lipoproteins, with applications to the study of atherosclerosis. J. phys. coll. chem. 55: 80, 1951
- 22) Mertz, D.P., Wobbe, H.D., Berger, A. and Goehmann, E.: Veränderungen der Serum-lipidwerte nach Umstellung auf eine "vernünftige Diät" Med. Klin. 72: 47-54, 1977
- 23) Mukherjee, K.D., Spaans, H. and Haahti, E.: New methods for detection and quantification in thin-layer chromatography. A study of pyrolysis and combustion systems. J. chromatog. sci. 10: 193-200, 1972
- 24) Nelson, G.J. and Freeman, N.K.: The phospholipid and phospholipid fatty acid composition of human serum lipoprotein fractions. J. Biol. Chem. 235: 578-583, 1960
- 25) Nye, W.H.R. and Waterhouse, C.: The phosphatides of human plasma. II. Abnormalities encountered in the nephrotic syndrome.

- J. clin. invest. 40: 1202-1207, 1961
- 26) Pedersen, K.O.: On a low density lipoprotein appearing in normal human plasma. J. phys. coll. chem. 51: 156, 1947
- 27) Peeters, H.: The biological significance of the plasma phospholipids. In: Phosphatidylcholine, p. 10-33, H. Peeters, ed., Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 1976
- 28) Phillips, G.B.: The isolation of lysolecithin from human serum. Proc. Nat. Acad. Sci. US 43: 566, 1957
- 29) Phillips, G.B.: The phospholipid composition of human serum lipoprotein fractions separated by ultracentrifugation. J. clin. invest. 38: 489-493, 1959
- 30) Phillips, G.B. and Wille, L.E.: The phospholipid composition of human serum lipoprotein fractions separated by electrophoresis on agarose gel. Demonstration of a fraction with high lysolecithin content. Clin. Chim. Acta 49: 153-160, 1973
- 31) Reckless, J.P.D., Betteridge, D.J., Wu, P., Payne, B. and Galton, D.J.: High density and low density lipoproteins and prevalence of vascular disease in diabetes mellitus. Brit. med. J. 1: 883-886, 1978

- 32) Robinson, N. and Phillips, B.M.: Quantitative thin-layer chromatography of serum phospholipids. Clin. Chim. Acta 8: 385-392, 1963
- 33) Shepherd, J., Packard, C.J., Patsch, J.R., Gotto, A.M.jr. and Taunton, O.D.: Effects of dietary polyunsaturated and saturated fat on the properties of high density lipoproteins and the metabolism of apolipoprotein A-1. J. clin. invest. 61: 1582-1592, 1978
- 34) Skipski, V.P., Peterson, R.F. and Barclay, M.: Quantitative analysis of phospholipids by thin-layer chromatography. Biochem. J. 90: 374-378, 1964
- 35) Skipski, V.P., Barclay, M., Barclay, R.K., Fetzer, V.A., Good, J.J. and Archibald, F.M.: Lipid composition of human serum lipoproteins. Biochem. J. 104: 340-352, 1967
- 36) Smith, E.B.: Lipids carried by S_f 0-20 lipoprotein in normal and hypercholesterolaemic serum. Lancet 2: 530-534, 1962
- 37) Svanborg, A. and Vikrot, O.: Plasma lipid fractions, including individual phospholipids, at various stages of pregnancy. Acta med. Scand. 178/5: 615-630, 1965
- 38) Wagner, H.: Neuere Ergebnisse auf dem Gebiet der Isolierung und Analytik von Phosphatiden und Glykolipiden. Fette Seifen Anstrichmittel 62: 1115-1117, 1960

- 39) Wagner, H., Hörhammer, L. und Wolff, P.:
Dünnschichtchromatographie von Phosphatiden
und Glykolipiden. Biochem. Z. 334: 175-184,
1961

- 40) Wilson, D.E. and Lees, R.S.: Metabolic
relationships among the plasma lipoproteins -
reciprocal changes in the concentration of
very low and low density lipoproteins in
man. J. clin. invest. 51: 1051-1057, 1972

- 41) Wolfram, G.: Änderungen der Phosphatid-
fraktionen im Serum unter fettreicher oder
fettarmer Formeldiät. Int. J. clin.
Pharmacol., Beiheft Fettstoffwechsel:
69-71, 1969

- 42) Wolfram, G. und Wegehaupt, H.: Die Phosphatid-
fraktionen im Serum unter einer fettarmen,
glucosereichen Diät. Verh. d. Dt. Ges. f.
Inn. Med. 75: 903-906, J. F. Bergmann,
Herausg., München, 1969

- 43) Wood, P.D., Haskell, W., Klein, H., Lewis, S.,
Stern, M.P. and Farquhar, J.W.: The distri-
bution of plasma lipoproteins in middle-aged
male runners. Metabolism 25: 1249-1257, 1976

- 44) Zöllner, N., Wolfram, G. und Londong, W.:
Untersuchungen über die Plasmalipoide bei
extrem fettarmer, kohlenhydratreicher Kost.
Z. ges. exp. Med. 140: 24-34, 1966

- 45) Zöllner, N.: In: Untersuchungen und Bestimmungen
der Lipoide im Blut, p. 35, Zöllner und

Eberhagen, Springer Verlag Berlin, Heidelberg,
New York, 1965

7.

ANHANG

Tab. 1 Zuteilung der sechs Versuchspersonen
zu den Formeldiäten im zeitlichen Ablauf

1.2.78 - 14.2.78

Versuchspersonen AB	Formeldiät III
Versuchspersonen CD	Formeldiät I
Versuchspersonen EF	Formeldiät II

15.2.78 - 28.2.78

Versuchspersonen AB	Formeldiät I
Versuchspersonen CD	Formeldiät II
Versuchspersonen EF	Formeldiät III

1.3.78 - 15.3.78

Versuchspersonen AB	Formeldiät II
Versuchspersonen CD	Formeldiät III
Versuchspersonen EF	Formeldiät I

Tab. 2 Zusammensetzung der drei Formeldiäten.

Zufuhr / Tag

Formeldiät I	87	g	Hypoprotidine
	483	g	Maltodextrin
Formeldiät II	87	g	Hypoprotidine
	312	g	Maltodextrin
	74,46	g	Fettgemisch
aus	47	g	Butter
	17,7	g	Olivenöl
	9,76	g	Distelöl
Formeldiät III	87	g	Hypoprotidine
	312	g	Maltodextrin
	71	g	Distelöl

Tab. 3 Fettsäuremuster der verwendeten Fettarten.

	Distel- öl	Oliven- öl	Butter
einfach ungesättigt	15 %	82 %	37 %
mehrfach ungesättigt	78 %	9 %	4 %
gesättigt	7 %	9 %	59 %

(gaschromatographische
Darstellung)

Tab. 4 Gesamtphosphatide sowie Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin in der VLDL-Fraktion der einzelnen Versuchspersonen in mg/100 ml Serum geordnet nach dem zeitlichen Ablauf des Versuchs.

		1.2.	15.2.	1.3.	15.3.	10.5.
A	G	20	20	7	1	11
	L	16,54	16,00	6,06	0,84	6,46
	S	3,14	3,80	0,83	0,14	3,20
	LL	0,32	0,20	0,11	0,02	1,34
B	G	10	13	12	6	6
	L	7,54	9,30	10,30	4,91	5,06
	S	2,05	3,52	1,42	1,07	0,81
	LL	0,41	0,18	0,28	0,02	0,13
C	G	11	20	2	2	7
	L	8,96	16,38	1,75	1,66	6,03
	S	1,83	3,34	0,23	0,29	0,76
	LL	0,21	0,28	0,02	0,05	0,21

		1.2.	15.2.	1.3.	15.3.	10.5.
D	G	26	25	9	10	19
	L	22,12	21,07	7,83	8,65	13,55
	S	3,59	3,60	1,04	1,25	4,33
	LL	0,29	0,33	0,13	0,10	1,12
E	G	26	5	5	14	22
	L	23,09	4,14	4,36	11,47	19,05
	S	2,52	0,83	0,54	2,32	2,36
	LL	0,39	0,03	0,10	0,21	0,59
F	G	4	8	1	6	1
	L	3,32	6,53	0,86	4,70	0,84
	S	0,64	1,40	0,11	1,21	0,15
	LL	0,04	0,07	0,03	0,09	0,01

G = Gesamtphosphatide
L = Lecithin
S = Sphingomyelin
LL = Lysolecithin

Tab. 5 Gesamtphosphatide sowie Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin in der LDL-Fraktion der einzelnen Versuchspersonen in mg / 100 ml Serum geordnet nach dem zeitlichen Ablauf des Versuchs.

		1.2.	15.2.	1.3.	15.3.	10.5.
A	G	66	51	40	63	69
	I	38,54	33,96	24,52	41,27	50,58
	S	26,93	16,58	15,48	21,04	18,01
	LL	0,53	0,46	-	0,69	0,41
B	G	57	30	31	52	44
	I	38,98	19,11	20,12	31,61	30,67
	S	16,25	10,68	10,79	19,71	12,89
	LL	1,77	0,21	0,09	0,68	0,44
C	G	77	43	53	35	70
	L	59,68	27,82	32,22	22,54	47,60
	S	16,86	14,62	20,03	11,83	21,91
	LL	0,46	0,56	0,75	0,63	0,49
D	G	79	51	69	64	64
	L	49,13	37,89	46,85	43,96	46,59
	S	29,55	13,01	21,80	19,14	16,26
	LL	0,32	0,10	0,35	0,90	1,15
E	G	43	41	24	39	35
	L	31,95	29,31	15,14	27,22	24,04
	S	10,49	11,69	8,57	11,43	10,43
	LL	0,56	-	0,29	0,35	0,53
F	G	65	58	38	56	40
	L	47,45	37,76	24,47	36,17	27,16
	S	17,16	19,37	13,30	19,38	12,60
	LL	0,39	0,87	0,23	0,45	0,24

Tab. 6 Gesamthosphatide sowie Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin in der HDL-Fraktion der einzelnen Versuchspersonen in mg / 100 ml Serum geordnet nach dem zeitlichen Ablauf des Versuchs.

		1.2.	15.2.	1.3.	15.3.	10.5.
A	G	148	95	93	103	123
	L	119,29	78,85	79,05	86,31	108,48
	S	20,13	10,26	12,00	13,91	10,21
	LL	8,58	5,89	1,95	2,78	4,31
B	G	135	99	82	114	139
	L	105,02	76,13	69,78	94,39	115,37
	S	19,85	16,14	9,68	17,56	13,62
	LL	10,13	6,73	2,54	2,05	10,01
C	G	87	83	94	94	90
	L	68,20	67,65	77,93	76,80	75,69
	S	13,49	9,46	12,50	15,13	11,34
	LL	5,31	5,89	3,57	2,07	2,97
D	G	124	83	94	88	136
	L	93,37	68,06	78,86	69,17	101,59
	S	18,60	7,55	9,78	12,85	28,70
	LL	12,03	7,39	5,36	5,98	5,71
E	G	73	89	69	89	89
	L	58,18	73,51	58,23	78,14	76,89
	S	10,22	9,08	8,42	7,57	10,15
	LL	4,60	6,41	2,35	3,29	1,96

F	G	137	106	67	97	113
	L	121,10	85,54	56,28	83,03	95,71
	S	13,02	15,37	8,78	11,83	12,77
	LL	2,88	5,09	1,94	2,14	4,52

Tab. 7 Gesamtposphatide sowie Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin in der VLDL-Fraktion der einzelnen Versuchspersonen in mg / 100 ml Serum und Abhängigkeit von den verschiedenen Formeldichten.

		A	I	II	III
A	G	20	7	1	20
	L	16,54	6,06	0,84	16,00
	S	3,14	0,83	0,14	3,80
	LL	0,32	0,11	0,02	0,20
B	G	10	12	6	13
	L	7,54	10,30	4,91	9,30
	S	2,05	1,42	1,07	3,52
	LL	0,41	0,28	0,02	0,18
C	G	11	20	2	2
	L	8,96	16,38	1,75	1,66
	S	1,83	3,34	0,23	0,29
	LL	0,21	0,28	0,02	0,05
D	G	26	25	9	10
	L	22,12	21,07	7,83	8,65
	S	3,59	3,60	1,04	1,25
	LL	0,29	0,33	0,13	0,10

		A	I	II	III
E	G	26	14	5	5
	L	23,09	11,47	4,14	4,36
	S	2,52	2,32	0,83	0,54
	LL	0,39	0,21	0,03	0,10
F	G	4	6	8	1
	L	3,32	4,70	6,53	0,86
	S	0,64	1,21	1,40	0,11
	LL	0,04	0,09	0,07	0,03

A = Ausgangswert

G = Gesamthosphatide

L = Lecithin

S = Sphingomyelin

LL = Lysolecithin

Tab. 8 Gesamthosphatide sowie Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin in der LDL-Fraktion der einzelnen Versuchspersonen in mg / 100 ml Serum und Abhängigkeit von den verschiedenen Formeldiäten.

		A	I	II	III
A	G	66	40	63	51
	L	38,54	24,52	41,27	33,96
	S	26,93	15,48	21,04	16,58
	LL	0,53	-	0,69	0,46
B	G	57	31	52	30
	L	38,98	20,12	31,61	19,11
	S	16,25	10,79	19,71	10,68
	LL	1,77	0,09	0,68	0,21

C	G	77	43	53	35
	L	59,68	27,82	23,22	22,54
	S	16,86	14,62	20,03	11,83
	LL	0,46	0,56	0,75	0,63
D	G	79	51	69	64
	L	49,13	37,89	46,85	43,96
	S	29,55	13,01	21,80	19,14
	LL	0,32	0,10	0,35	0,90
E	G	43	39	41	24
	L	31,95	27,22	29,31	15,14
	S	10,49	11,43	11,69	8,57
	LL	0,56	0,35	-	0,29
F	G	65	56	58	38
	L	47,45	36,17	37,76	24,47
	S	17,16	19,38	19,37	13,30
	LL	0,39	0,45	0,87	0,23

Tab. 9 Gesamtphosphatide sowie Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin in der HDL-Fraktion der einzelnen Versuchspersonen in mg / 100 ml Serum und Abhängigkeit von den verschiedenen Formeldiäten.

		A	I	II	III
A	G	148	93	103	95
	L	119,29	79,05	86,31	78,85
	S	20,13	12,00	13,91	10,26
	LL	8,58	1,95	2,78	5,89

		A	I	II	III
B	G	135	82	114	99
	L	105,02	69,78	94,39	76,13
	S	19,85	9,68	17,56	16,14
	LL	10,13	2,54	2,05	6,73
C	G	87	83	94	94
	L	68,20	67,65	77,93	76,80
	S	13,49	9,46	12,50	15,13
	LL	5,31	5,89	3,57	2,07
D	G	124	83	94	88
	L	93,37	68,06	78,86	69,17
	S	18,60	7,55	9,78	12,85
	LL	12,03	7,39	5,36	5,98
E	G	73	89	89	69
	L	58,18	78,14	73,51	58,23
	S	10,22	7,57	9,08	8,42
	LL	4,60	3,29	6,41	2,35
F	G	137	97	106	67
	L	121,10	83,03	85,54	56,28
	S	13,02	11,83	15,37	8,78
	LL	2,88	2,14	5,09	1,94

Tab. 10 - 15

Vergleich der Ausgangswerte von Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin in den einzelnen Lipoproteinfractionen mit Ergebnissen anderer Untersuchungen. Angegeben sind die Einzelwerte der sechs Versuchspersonen in Prozent Phosphatidanteil und in mg / 100 ml Serum.

Tab. 10	VLDL (%)	Lecithin	Sphingomyelin	Lysolecithin
Nelson und F. (24)	71,2 -	75,9	17,0 -	20,2
Skipski (35)	48,7 -	78,5	14,0 -	17,0
Phillips a.W. (30)	73,7 -	80,9	11,9 -	16,1
Formeldiätversuch	75,4 -	88,8	9,7 -	20,5
				2,7 -
				1,3 -
				0,9 -
				4,1
				--
				0,11 -
				0,04 -
				0,04 -
				0,41
				--
				1,8 -
				0 -
				3
				0,4 -
				3,1
				--
				23,8 -
				21,3 -
				28 -
				34
				21,9 -
				40,8
				--
				66,2 -
				54,6 -
				57 -
				58,4 -
				77,5
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66
				23,09
				3,59
				0,64
				0,61
				0,74
				13,59
				53,86
				3,45
				12,66

Tab. 13

LDL (mg / 100 ml)	Lecithin	Sphingomyelin	Lysolecithin
<u>Nelson und F. (24)</u>	37,34 -	64,77 -	13,57 - 26,32
Skipski (35)	40,40 -	54,53 -	15,76 - 21,53
Choksey und F. (7)	30,21 -	60,72 -	14,84 - 31,28
Formeldiätversuch	31,95 -	59,68 -	10,49 - 29,55

Tab. 14

HDL (%)
<u>Phillips (29)</u>
Skipski (35)
Phillips und W. (30)
Formeldiätversuch

67,0 -	73,6 -	11,9 -	15,1 -	7,2 -	14,8 -
64,4 -	80,1 -	8,8 -	14,8 -	3,0 -	8,4 -
65,8 -	74,2 -	10,0 -	12,8 -	9,4 -	17,3 -
75,3 -	88,4 -	9,5 -	15,5 -	2,1 -	9,7 -

Tab. 15

HDL (mg / 100 ml)
<u>Phillips (29)</u>
Skipski (35)
Choksey und F. (7)
Formeldiätversuch

66,66 -	108,52 -	12,40 -	21,70 -	9,30 -	16,27 -
57,41 -	71,42 -	7,89 -	13,23 -	2,67 -	7,49 -
64,26 -	130,98 -	9,18 -	40,71 -	1,02 -	19,47 -
58,18 -	121,10 -	10,22 -	20,13 -	2,88 -	12,03 -

Tab. 16 - 21

Vergleich der Ausgangswerte von Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin in den einzelnen Lipoproteinfraktionen mit Ergebnissen anderer Untersuchungen. Angegeben sind die Mittelwerte der sechs Versuchspersonen in Prozent Phosphatidanteil und in mg / 100 ml Serum.

Tab. 16	VLDL (%)	Lecithin	Sphingomyelin	Lysolecithin
	Nelson und F. (24)	74,0	18,3	--
	Skipski (35)	59,7	14,8	5,0
	Phillips a.W. (30)	77,3	14,0	3,0
	Formeldiätversuch	80,6	16,2	3,2
Tab. 17	VLDL (mg / 100 ml)			
	Nelson und F. (24)	40,86	10,20	--
	Skipski (35)	2,62	0,65	0,22
	Phillips a.W. (30)	7,51	1,36	0,29
	Formeldiätversuch	11,04	2,12	0,43
Tab. 18	LDL (%)			
	Nelson und F. (24)	68,8	25,6	--
	Skipski (35)	63,7	25,9	2,7
	Choksey und F. (7)	64	30	2
	Formeldiätversuch	69,5	29,4	1,1

Tab. 19

LDL (mg / 100 ml)	Lecithin	Spingomyelin	Lysolecithin
<u>Nelson und F. (24)</u>	50,53	18,96	--
Skipski (35)	47,13	19,16	1,99
Choksey und F. (7)	39,04	18,30	1,22
Formeldiätversuch	41,03	17,45	0,61

Tab. 20

HDL (%)	
<u>Phillips (29)</u>	13,6
Skipski (35)	12,4
Peeters (27)	11,0
Formeldiätversuch	13,1

69,9	11,2
72,0	5,8
74,6	7,7
81,7	5,2

Tab. 21

HDL (mg / 100 ml)	
<u>Phillips (29)</u>	17,82
Skipski (35)	11,09
Choksey und F. (7)	19,89
Formeldiätversuch	15,18

89,14	13,95
64,15	5,23
83,07	8,19
94,91	6,09

Abb. 1 Chemische Struktur eines
Phosphatidylcholinmoleküls





Abb. 2 Schematischer Aufbau des
Becker TLC - Detector



F.I.D.

1 = Kupferofen

2 = Nickelofen

3 = Flame ionisation detector

4 = Heizspirale


5 = Quarzröhrchen mit Kieselgelbeschichtung

Abb. 3

ZUSAMMENSETZUNG DER DREI FORMELDIÄETEN

15% EI-WEISS	KOHLENHYDRATE 85 %	FORMEL-DIÄET I
15% EI-WEISS	FETT 30% KOHLENHYDRATE 55%	FORMEL-DIÄET II UND III

ZUSAMMENSETZUNG DES FETTANTEILS



LINOLSAEURE 10 G F. D. II

LINOLSAEURE 50 G F. D. III

Abb. 4 - 27

Anteilmäßige Zusammensetzung der VLDL-Phosphatide bei den Versuchspersonen A - F am Ende der vierzehntägigen Formeldiätperioden. Jeder dargestellte Wert ist das Ergebnis mindestens einer Doppelbestimmung.

- = Lecithin
- = Sphingomyelin
- ▲ = Lysolecithin

- Abb. 4 - 9 Relativwerte in zeitlicher Folge
- Abb. 10 - 15 Relativwerte in Abhängigkeit von der Formeldiät
- Abb. 16 - 21 Absolutwerte in zeitlicher Folge
- Abb. 22 - 27 Absolutwerte in Abhängigkeit von der Formeldiät

Abb. 4

[%]

VLDL A




Abb. 5

[%]

VLDL B




Abb. 6 [%]




Abb. 7 [%]




Abb. 8






Abb. 9



VLDL A



VLDL B




Abb. 12




Abb. 13




Abb. 14

[%]

VLDL E






Abb. 15

[%]


VLDL F



VLDL A




VLDL B



VLDL C

[mg/100 ml]


Abb. 18



VLDL D

[mg/100 ml]


Abb. 19



VLDL E

[mg/100 ml]


Abb. 20




VLDL F

[mg/100 ml]


Abb. 21




VLDL A




VLDL B



VLDL C




VLDL D



VLDL E

[mg/100 ml]
Abb. 26



VLDL F

[mg/100 ml]
Abb. 27




Abb. 28 - 51

Anteilmäßige Zusammensetzung der LDL-Phosphatide bei den Versuchspersonen A - F am Ende der vierzehntägigen Formeldiätperioden. Jeder dargestellte Wert ist das Ergebnis mindestens einer Doppelbestimmung.

- = Lecithin
- = Sphingomyelin
- ▲ = Lysolecithin

Abb. 28 - 33 Relativwerte in zeitlicher Folge

Abb. 34 - 39 Relativwerte in Abhängigkeit von der Formeldiät

Abb. 40 - 45 Absolutwerte in zeitlicher Folge

Abb. 46 - 51 Absolutwerte in Abhängigkeit von der Formeldiät

Abb. 28




Abb. 29




Abb. 30




Abb. 31




Abb. 32




Abb. 33




Abb. 34




Abb. 35




Abb. 36




Abb. 37




Abb. 38







Abb. 39




LDL A




LDL B




LDL C




LDL D




LDL E




LDL F




LDL A




LDL B




LDL C



LDL D



LDL E



LDL F




Abb. 52 - 75

Anteilmäßige Zusammensetzung der HDL-Phosphatide bei den Versuchspersonen A - F am Ende der vierzehntägigen Formeldiätperioden. Jeder dargestellte Wert ist das Ergebnis mindestens einer Doppelbestimmung.

- = Lecithin
- = Sphingomyelin
- ▲ = Lysolecithin

- Abb. 52 - 57 Relativwerte in zeitlicher Folge
- Abb. 58 - 63 Relativwerte in Abhängigkeit von der Formeldiät
- Abb. 64 - 69 Absolutwerte in zeitlicher Folge
- Abb. 70 - 75 Absolutwerte in Abhängigkeit von der Formeldiät

Abb. 52




Abb. 53




Abb. 54




Abb. 55




Abb. 56




Abb. 57




Abb. 58






Abb. 59



2.UST C

Abb. 60



2.UST D

Abb. 61




Abb. 62







Abb. 63



2.UST A




2.UST B




2. UST C

Abb. 66




2. UST D


Abb. 67




2. UST E




2. UST F



2.UST A




2.UST B




2.UST C

[mg/100 ml]
Abb. 72




2.UST D

[mg/100 ml]
Abb. 73



2. UST E

[mg/100ml]
Abb. 74



2. UST F

[mg/100ml]
Abb. 75






Abb. 76 - 87

Relative und absolute Änderung der Mittelwerte von
Lecithin, Sphingomyelin und Lysolecithin in den
einzelnen Lipoproteinfraktionen im zeitlichen Ablauf
und in Abhängigkeit von den drei Formeldiäten

MIT BEWEISEN IN PROZENT VON LECITHIN, SPHINGOMYELIN UND LYSOLECITHIN IN DER VLDL-FRAKTION UNTER FORMELDIÄTEN MIT 0,10, 50 GRAMM LINOLSÄUREZUFUHR IN ABHÄNGIGKEIT VON DER ZEIT




MITTELWERTE INPROZENT VON LECITHIN, SPHINGO-
MYELIN UND LYSOLECITHIN IN DER VLDL-FRAKTION
UNTER FORMELDIÆTEN MIT 0,10, 50 GRAMM LIN-
OLSÆUREZUFUHR IN ABHÆNGIGKEIT VON DER FOR-
MELDIÆT




(N=6)

MIT TEILWEERTE IN MG/100 ML VON LECITHIN, SPHINGOMYELIN UND LYSOLECITHIN IN DER VLDL-FRAKTION UNTER FORMELDIÄTEN MIT 0,10, 50 GRAMM LINOLSÄUREZUFUHR IN ABHÄNGIGKEIT VON DER ZEIT




(N=6)

MITTELWERTE IN MG/100ML VON LECITHIN, SPHINGO-
MYELIN UND LYSOLECITHIN IN DER VLDL-FRAKTION
UNTER FORMELDIÄTEN MIT 0,10, 50 GRAMM LIN-
OLSÄUREZUFUHR IN ABHÄNGIGKEIT VON DER FOR-
MELDIÄT




(N=6)

MITTELWERTE IN PROZENT VON LECITHIN, SPHINGOMYELIN UND LYSOLECITHIN IN DER LDL-FRAKTION UNTER FORMELDIÄTEN MIT 0,10, 50 GRAMM LINOLSÄUREZUFUHR IN ABHÄNGIGKEIT VON DER ZEIT




(N=6)

MITTELWERTE INPROZENT VON LECITHIN, SPHINGOMYELIN, LYSOLECITHIN IN DER LDL-FRAKTION UNTER FORMELDIÆTEN MIT 0,10, 50 GRAMM LIN-OLSÆUREZUFUHR IN ABHÆNGIGKEIT VON DER FORMELDIÆT




(N=6)

MITTELWERTE IN MG/100ML VON LECITHIN, SPHINGOMYELIN UND LYSOLECITHIN IN DER LDL-FRAKTION UNTER FORMELDIÄTEN MIT 0,10, 50 GRAMM LINOLSÄUREZUFUHR IN ABHÄNGIGKEIT VON DER ZEIT




(N=6)

MITTELWERTE IN MG/100ML VON LECITHIN, SPHINGOMYELIN UND LYSOLECITHIN IN DER LDL-FRAKTION UNTER FORMELDIÆTEN MIT 0,10, 50 GRAMM LINOLSÆUREZUFUHR IN ABHÆNGIGKEIT VON DER FORMELDIÆT




(N=6)

IV. WERTE IN PROZENT VON LECITHIN, SPHINGOMYELIN UND LYSOLECITHIN IN DER HDL-FRAKTION UNTER FORMELDIÄTEN MIT 0,10, 50 GRAMM LIPIDSÄUREZUFUHR IN ABHÄNGIGKEIT VON DER ZEIT




(N=6)

MITTELWERTE INPROZENT VON LECITHIN, SPHINGO-
MYELIN UND LYSOLECITHIN IN DER HDL-FRAKTION
UNTER FORMELDIÆTEN MIT 0,10, 50 GRAMM LIN-
OLSÆUREZUFUHR IN ABHÆNGIGKEIT VON DER FOR-
MELDIÆT




{ N=6 }

MIT TEEVERTE IN MG/100 ML VON LECITHIN, SPHINGOMYELIN UND LYSOLECITHIN IN DER HDL-FRAKTION UNTER FORMELDIÄTEN MIT 0,10, 50 GRAMM LINOLSÄUREZUFUHR IN ABHÄNGIGKEIT VON DER ZEIT



MITTELWERTE IN MG/100ML VON LECITHIN, SPHINGOMYELIN UND LYSOLECITHIN IN DER HOL-FRAKTION UNTER FORMELDIÆTEN MIT 0,10,50 GRAMM LIN-
OLSÆUREZUFUHR IN ABHÆNGIGKEIT VON DER FOR-
MELDIÆT



(N=6)

LEBENS LAUF

Name:	Oswald Spitzenberger
geboren:	29. August 1952
verheiratet:	seit 4. August 1979 mit Eva Spitzenberger, geb. Wunder
Eltern:	Josef Spitzenberger, Kaufmann Hermine Spitzenberger, geb. Herzig
Geschwister:	Josef, Erich, Karl
Schulen:	1958 - 1963 Volksschule in Mitter- firmiansreut / Bayer. Wald 1963 - 1972 Gymnasium Zwiesel
Bundeswehr:	1972 - 1973 Grundwehrdienst beim 2./ Feldartilleriebataillon 41 in Regensburg
Studium:	1973 - 1974 Chemie an der Universität Regensburg 1974 - 1978 Oecotrophologie an der Justus - Liebig - Universität Gießen 1978 Diplomhauptprüfung in Oecotrophologie 1976 - 1978 Humanmedizin an der Philipps - Universität Marburg März 1977: Physikum März 1978: 1. Staatsexamen 1978 - 1981 Humanmedizin an der Technischen Universität München August 1980: 2. Staatsexamen Oktober 1980 - September 1981 Praktische Ausbildung im Klinikum Rechts der Isar und Krankenhaus Oberföhring Okt. 1981 Approbation als Arzt

